

Indikationsübersicht Rasenprodukte

Kultur	Indikationen	Produkttyp	Produkt	Wirkstoffe	Einsatzzeitraum	Aufwandmenge	Zulassung/ Genehmigung nach Artikel 51	Anzahl Anwendungen	Wartezeit [Tage]	Zulassungsende	Bemerkung
Rasen (Zier- und Sportrasen)	Zweikeimblättrige Unkräuter	Herbizid	Banvel® M	30 g/l Dicamba + 340 g/l MCPA	Während der Vegetationsperiode (April bis September), nicht im Ansaatzjahr.	6 l/ha in 1000 l Wasser/ha (Spritzanwendung). Bei Gießanwendung 10- fache Wassermenge verwenden.		2	F	31.12.2017	
Rasen (Zier- und Sportrasen)	Zweikeimblättrige Unkräuter	Herbizid	Banvel® M	30 g/l Dicamba + 340 g/l MCPA	Während der Vegetationsperiode (April bis September), nicht im Ansaatzjahr.	6 l/ha in 1000 l Wasser/ha (Spritzanwendung). Bei Gießanwendung 10- fache Wassermenge verwenden.	§17	2	F	31.12.2017	Flächen für die Allgemeinheit: Golf - und Sportplätze
Rasen (Golf- und Sportrasen)	Schneeschnitzel (<i>Monographella nivalis</i>)	Fungizid	Heritage®	500 g/kg Azoxystrobin	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.	0,5 kg/ha mit 800 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.07.2021	Verkauf durch EVERISS
Rasen (Golf- und Sportrasen)	Schneeschnitzel (<i>Monographella nivalis</i>)	Fungizid	Heritage®	500 g/kg Azoxystrobin	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.	0,5 kg/ha mit 800 - 1000 l Wasser/ha, Spritzen mit Rücken- oder Flächenspritze	§17	4	F	31.07.2021	Freiland, Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind: Öffentliche Parks und Gärten, Funktionsflächen auf Golf - und Sportplätze
Rasen (Golf- und Sportrasen)	Schwarzbeinigkeit (<i>Gaeumanomyces</i>)	Fungizid	Heritage®	500 g/kg Azoxystrobin	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.	0,5 kg/ha mit 800 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.07.2021	Verkauf durch EVERISS
Rasen (Golf- und Sportrasen)	Schwarzbeinigkeit (<i>Gaeumanomyces graminis</i>)	Fungizid	Heritage®	500 g/kg Azoxystrobin	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.	0,5 kg/ha mit 800 - 1000 l Wasser/ha, Spritzen mit Rücken- oder Flächenspritze	§17	4	F	31.07.2021	Freiland, Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind: Öffentliche Parks und Gärten, Funktionsflächen auf Golf - und Sportplätze
Rasen (Golf- und Sportrasen)	Gräser-Anthraknose (<i>Colletotrichum graminicola</i>)	Fungizid	Heritage®	500 g/kg Azoxystrobin	zur Befallsminderung. Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.	0,5 kg/ha mit 800 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.07.2021	Verkauf durch EVERISS
Rasen (Golf- und Sportrasen)	Blattfleckenkrankheit (<i>Drechslera poae</i>)	Fungizid	Heritage®	500 g/kg Azoxystrobin	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.	0,5 kg/ha mit 800 - 1000 l Wasser/ha, Spritzen mit Rücken- oder Flächenspritze	§17	4	F	31.07.2021	Freiland, Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind: Öffentliche Parks und Gärten, Funktionsflächen auf Golf - und Sportplätze
Rasen (Golf- und Sportrasen)	Blattfleckenkrankheit (<i>Drechslera poae</i>)	Fungizid	Heritage®	500 g/kg Azoxystrobin	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.	0,5 kg/ha mit 800 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.07.2021	Verkauf durch EVERISS
Rasen (Golf- und Sportrasen)	Puccinia-Arten	Fungizid	Heritage®	500 g/kg Azoxystrobin	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.	0,5 kg/ha mit 800 - 1000 l Wasser/ha, Spritzen mit Rücken- oder Flächenspritze	§17	4	F	31.07.2021	Freiland, Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind: Öffentliche Parks und Gärten, Funktionsflächen auf Golf - und Sportplätze
Rasen (Golf- und Sportrasen)	Puccinia-Arten	Fungizid	Heritage®	500 g/kg Azoxystrobin	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.	0,5 kg/ha mit 800 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.07.2021	Verkauf durch EVERISS
Rasen (Golf- und Sportrasen)	<i>Rhizoctonia solani</i>	Fungizid	Heritage®	500 g/kg Azoxystrobin	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.	0,5 kg/ha mit 800 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.07.2021	Verkauf durch EVERISS
Rasen (Golf- und Sportrasen)	<i>Rhizoctonia solani</i>	Fungizid	Heritage®	500 g/kg Azoxystrobin	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.	0,5 kg/ha mit 800 - 1000 l Wasser/ha, Spritzen mit Rücken- oder Flächenspritze	§17	4	F	31.07.2021	Freiland, Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind: Öffentliche Parks und Gärten, Funktionsflächen auf Golf - und Sportplätze

Indikationsübersicht Rasenprodukte

Kultur	Indikationen	Produkttyp	Produkt	Wirkstoffe	Einsatzzeitraum	Aufwandmenge	Zulassung/ Genehmigung nach Artikel 51	Anzahl Anwendungen	Wartezeit [Tage]	Zulassungsende	Bemerkung
Rasen (Golfrasen)	zur Halmverkürzung auf Golfplätzen (Fairways) bei <i>Lolium perenne</i>	Wachstums- regler	Primo® Maxx	107,5 g/l Trinexapac	im Abstand von 2-4 Wochen	2,4 l/ha mit 300 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.10.2015 Widerruf	Abverkaufsfrist: 30.04.2016; Aufbrauchsfrist: 30.04.2017
Rasen (Golfrasen) - Flächen für die Allgemeinheit	zur Halmverkürzung auf Golfplätzen (Fairways) bei <i>Lolium perenne</i>	Wachstums- regler	Primo® Maxx	107,5 g/l Trinexapac	im Abstand von 2-4 Wochen	2,4 l/ha mit 300 - 1000 l Wasser/ha	§17	4	F	30.04.2019	Verkauf durch EVERRIS
Rasen (Zier- und Sportrasen)	zur Halmverkürzung auf Zier- und Sportrasen bei <i>Lolium perenne</i>	Wachstums- regler	Primo® Maxx	107,5 g/l Trinexapac	im Abstand von 2-4 Wochen	3,2 l/ha mit 300 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.10.2015 Widerruf	Abverkaufsfrist: 30.04.2016; Aufbrauchsfrist: 30.04.2017
Rasen (Zier- und Sportrasen) Flächen für die Allgemeinheit	zur Halmverkürzung auf Zier- und Sportrasen bei <i>Lolium perenne</i>	Wachstums- regler	Primo® Maxx	107,5 g/l Trinexapac	im Abstand von 2-4 Wochen	3,2 l/ha mit 300 - 1000 l Wasser/ha	§17	4	F	30.04.2019	Verkauf durch EVERRIS
Rasen (Zier- und Sportrasen)	zur Halmverkürzung auf Zier- und Sportrasen bei <i>Agrostis palustris</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Poa pratensis</i>	Wachstums- regler	Primo® Maxx	107,5 g/l Trinexapac	im Abstand von 2-4 Wochen	2,4 l/ha mit 300 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.10.2015 Widerruf	Abverkaufsfrist: 30.04.2016; Aufbrauchsfrist: 30.04.2017
Rasen (Zier- und Sportrasen) Flächen für die Allgemeinheit	zur Halmverkürzung auf Zier- und Sportrasen bei <i>Agrostis palustris</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Poa pratensis</i>	Wachstums- regler	Primo® Maxx	107,5 g/l Trinexapac	im Abstand von 2-4 Wochen	2,4 l/ha mit 300 - 1000 l Wasser/ha	§17	4	F	30.04.2019	Verkauf durch EVERRIS
Rasen (Golfrasen)	zur Halmverkürzung auf Golfplätzen (Greens) bei bei <i>Agrostis palustris</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Poa pratensis</i>	Wachstums- regler	Primo® Maxx	107,5 g/l Trinexapac	im Abstand von 2-4 Wochen	0,4 l/ha mit 300 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.10.2015 Widerruf	Abverkaufsfrist: 30.04.2016; Aufbrauchsfrist: 30.04.2017
Rasen (Golfrasen) Flächen für die Allgemeinheit	zur Halmverkürzung auf Golfplätzen (Greens) bei bei <i>Agrostis palustris</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Poa pratensis</i>	Wachstums- regler	Primo® Maxx	107,5 g/l Trinexapac	im Abstand von 2-4 Wochen	0,4 l/ha mit 300 - 1000 l Wasser/ha	§17	4	F	30.04.2019	Verkauf durch EVERRIS
Rasen (Golfrasen)	zur Halmverkürzung auf Golfplätzen (Fairways) bei <i>Agrostis palustris</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Poa pratensis</i>	Wachstums- regler	Primo® Maxx	107,5 g/l Trinexapac	im Abstand von 2-4 Wochen	1,6 l/ha mit 300 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.10.2015 Widerruf	Abverkaufsfrist: 30.04.2016; Aufbrauchsfrist: 30.04.2017
Rasen (Golfrasen) Flächen für die Allgemeinheit	zur Halmverkürzung auf Golfplätzen (Fairways) bei <i>Agrostis palustris</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Poa pratensis</i>	Wachstums- regler	Primo® Maxx	107,5 g/l Trinexapac	im Abstand von 2-4 Wochen	1,6 l/ha mit 300 - 1000 l Wasser/ha	§17	4	F	30.04.2019	Verkauf durch EVERRIS
Zierpflanzen Rasen	Rasen ausgenommen Golfplätze: Greens und Tees Schneeschnitz (<i>Monographella nivalis</i>)	Fungizid	Banner® maxx	155,87 g/l Propiconazol	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	3 l/ha in 400 - 1000 l Wasser/ha		1	F	31.10.2015 Widerruf	Abverkaufsfrist: 30.04.2016; Aufbrauchsfrist: 30.04.2017
Zierpflanzen Rasen - Flächen für die Allgemeinheit	Sportplätze Schneeschnitz (<i>Monographella nivalis</i>)	Fungizid	Banner® maxx	155,87 g/l Propiconazol	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	3 l/ha in 400 - 1000 l Wasser/ha	§17	4	F	31.01.2018	Verkauf durch EVERRIS
Zierpflanzen Rasen - Flächen für die Allgemeinheit	Sportplätze Dollarflecken- Krankheit (<i>Sclerotinia homoeocarpa</i>)	Fungizid	Banner® maxx	155,87 g/l Propiconazol	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	3 l/ha in 400 - 1000 l Wasser/ha	§17	4	F	31.01.2018	Verkauf durch EVERRIS

Indikationsübersicht Rasenprodukte

Kultur	Indikationen	Produkttyp	Produkt	Wirkstoffe	Einsatzzeitraum	Aufwandmenge	Zulassung/ Genehmigung nach Artikel 51	Anzahl Anwendungen	Wartezeit [Tage]	Zulassungsende	Bemerkung
Zierpflanzen Rasen - Flächen für die Allgemeinheit	Golfplätze: Greens und Tees Schneeschnitz (<i>Monographella nivalis</i>)	Fungizid	Banner® maxx	155,87 g/l Propiconazol	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	3 l/ha in 400 - 1000 l Wasser/ha	§17	4	F	31.01.2018	Verkauf durch EVERRIS
Zierpflanzen Rasen	Golfplätze: Greens und Tees Schneeschnitz (<i>Monographella nivalis</i>)	Fungizid	Banner® maxx	155,87 g/l Propiconazol	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	3 l/ha in 400 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.10.2015 Widerruf	Abverkaufsfrist: 30.04.2016; Aufbrauchsfrist: 30.04.2017
Zierpflanzen Rasen - Flächen für die Allgemeinheit	Golfplätze: Greens und Tees Dollarflecken- Krankheit (<i>Sclerotinia homoeocarpa</i>)	Fungizid	Banner® maxx	155,87 g/l Propiconazol	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	3 l/ha in 400 - 1000 l Wasser/ha	§17	4	F	31.01.2018	Verkauf durch EVERRIS
Zierpflanzen Rasen	Rasen ausgenommen Golfplätze: Greens und Tees Dollarflecken- Krankheit (<i>Sclerotinia homoeocarpa</i>)	Fungizid	Banner® maxx	155,87 g/l Propiconazol	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	3 l/ha in 400 - 1000 l Wasser/ha		1	F	31.10.2015 Widerruf	Abverkaufsfrist: 30.04.2016; Aufbrauchsfrist: 30.04.2017
Zierpflanzen Rasen	Golfplätze: Greens und Tees Dollarflecken- Krankheit (<i>Sclerotinia homoeocarpa</i>)	Fungizid	Banner® maxx	155,87 g/l Propiconazol	bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	3 l/ha in 400 - 1000 l Wasser/ha		4	F	31.10.2015 Widerruf	Abverkaufsfrist: 30.04.2016; Aufbrauchsfrist: 30.04.2017
Zierpflanzen Sportrasen, Flächen für die Allgemeinheit	Erdraupen	Insektizid	Karate® Zeon	100 g/l Lambda - Cyhalothrin	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	0,075 l/ha in 400 - 600 l Wasser/ha	Artikel 51, §17	2	N	31.12.2022	Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind
Zierpflanzen Golfrasen, Greens und Tees, Flächen für die Allgemeinheit	Erdraupen	Insektizid	Karate® Zeon	100 g/l Lambda - Cyhalothrin	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	0,075 l/ha in 400 - 600 l Wasser/ha	Artikel 51 incl. §17	2	N	31.12.2022	Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind
Zierpflanzen Golfrasen, Fairways, Flächen für die Allgemeinheit	Erdraupen	Insektizid	Karate® Zeon	100 g/l Lambda - Cyhalothrin	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	0,075 l/ha in 400 - 600 l Wasser/ha	Artikel 51 incl. §17	2	N	31.12.2022	Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind

Artikel 51 Genehmigung nach Artikel 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009.

§17: Genehmigung auf Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung. Diese Informationen ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung. Bindend ist der Text an der deutschen Syngenta-Verkaufware. Diese Informationen gelten nur für das Vertriebsgebiet Deutschland. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. **Stand: November 2015**

Wichtiger Hinweis zu allen nach Artikel 51 genehmigten Anwendungsgebieten:

Bei der Anwendung des Mittels in genehmigten Anwendungsgebieten ist zu beachten, dass die Prüfung der Wirksamkeit des Mittels in dem genehmigten Anwendungsgebiet und möglicher Schaden an Kulturpflanzen grundsätzlich nicht Gegenstand des Genehmigungsverfahrens der deutschen Zulassungsbehörde und daher nicht ausreichend getestet und geprüft ist. Mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an den Kulturpflanzen liegen somit nicht im Verantwortungsbereich des Herstellers, sondern ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Die Wirksamkeit und Pflanzenverträglichkeit des Mittels ist daher vom Anwender vor der Ausbringung des Mittels ausreichend zu prüfen.

Eine Liste der zusätzlich genehmigten Anwendungsgebiete sowie weitere Informationen können über das **Syngenta BeratungsCenter 0800/3240275 (gebührenfrei)** bzw. **www.syngenta.de** angefordert werden.

Informationen zum Einsatz und zur Anwendung unserer Produkte nach Genehmigungen §18a PflSchG finden oder erhalten Sie:

- beim **BeratungsCenter Tel. 0800/3240275 (gebührenfrei)**

- im Internet: **www.bvl.bund.de, www.syngenta.de**

- beim **Amtlichen Dienst**