

# STRATEGIEN FÜR GESUNDE ERDBEEREN

## Im Freiland



Frühjahr



Beginn der Blüte



Mitte der Blüte



Ende der Blüte



Nach der Ernte

### Ertragsanlagen

<b>Botrytis Colletotrichum, Gnomonia<sup>2</sup></b>	Triazol-Fungizid	<b>Switch<sup>®</sup></b> 1 kg/ha, max. 2x	<b>Ortiva<sup>®1</sup> + Botrytizid*</b> 1 l/ha, max. 2x	<b>Switch<sup>®</sup></b> 1 kg/ha, max. 2x	<b>Ortiva<sup>®1</sup> + Botrytizid*</b> 1 l/ha, max. 2x
<b>Mehltau</b>	<b>Topas<sup>®1</sup></b> 0,5 l/ha, max. 4x				
<b>Beißende und saugende Insekten</b> (ausgenommen Erdbeerblütenstecher)	<b>Karate<sup>®</sup> Zeon<sup>1</sup></b> 75 ml/ha, max. 2x				
<b>Thripse</b>	<b>Evure<sup>®1</sup></b> 0,2 l/ha, max. 2x				
<b>Schadgräser</b>	<b>Zetrola<sup>®</sup></b> 0,75 l/ha, max. 1x				

<sup>1</sup>genehmigt nach Art. 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009

<sup>2</sup>Zusatzwirkung (nach eigenen Erfahrungen)

\*Wirkstoffwechsel (kein Produkt aus der Gruppe der Anilinopyrimidine)

# Im geschützten Anbau



Vor der Blüte



Beginn der Blüte



Ende der Blüte

Nach der Ernte

	Ertragsanlagen			
<b>Botrytis, Colletotrichum<sup>2</sup>, Gnomonia<sup>2</sup></b>	Triazol-Fungizid	<b>Switch<sup>®</sup></b> 1 kg/ha, max. 2x	<b>Switch<sup>®</sup></b> 1 kg/ha, max. 2x	
<b>Mehltau</b>		<b>Topas<sup>®1</sup></b> 0,5 l/ha, max. 4x		
<b>Beißende und saugende Insekten</b> (ausgenommen Erdbeerblütenstecher)		<b>Karate<sup>®</sup> Zeon*</b> 75 ml/ha, max. 2x		

<sup>1</sup>genehmigt nach Art. 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009

<sup>2</sup>Zusatzwirkung (nach eigenen Erfahrungen)

**Besonderer Hinweis:** Tunnel regelmäßig lüften, um den Infektionsdruck durch Pilzkrankheiten zu verringern

