syngenta®

ORONDIS ®Vip –


VIP Schutz für Ihre Pflanzen



- ✓ Hohe Wirkungssicherheit bei guter Kurativleistung
- ✓ Verträglich und breit mischbar
- ✓ Lange Dauerwirkung

Orondis® Vip

Ornamentals



Falsche Mehltau-Pilze (Oomyceten) sind wichtige Schaderreger im Gartenbau. Schadpilze wie **Falscher Mehltau-, Phytophthora- und Pythium-Arten** befallen fast alle wichtigen Kulturen im Zierpflanzenbau. Ihre häufig zuerst latente, kaum sichtbare, dann schnelle Ausbreitung sowie ihr hohes Potenzial an Resistenzbildung stellt Produzenten vor große Herausforderungen.

ORONDIS VIP ist ein neues Werkzeug **zur Bekämpfung von Falschem Mehltau und Phytophthora mit Nebenwirkung auf Pythium in Zierpflanzen und Baumschulen!** Die innovative Fungizid-Kombination überzeugt durch eine perfekt aufeinander abgestimmte Wirkstoffkombination gegen die schwierig zu bekämpfenden Schadpilze. Die einzigartige Formulierung rundet das Produkt durch eine optimale Wirkstoffaufnahme und damit verbesserte Krankheitskontrolle ab.



PRODUKTPROFIL ORONDIS VIP

WIRKSTOFFE	Oxathiapiprolin 30 g/L	Metalaxyl-M 174,4 g/L
FRAC-GRUPPE	Piperidinylthiazole-isoxazoline Gruppe 49	Phenylamide Gruppe 4
Wirkmechanismus	Hemmung der Lipidbiosynthese	Hemmung der RNA- Synthese
Formulierung	Dispergierbares Konzentrat (DC - Formulierung)	
Zulassung in Zierpflanzen unter Glas und im Freiland nach Art. 51:		
Wirkungsspektrum	Falsche Mehltau-Arten, Phytophthora-Arten	
Aufwandmenge	0,5 L/ha	
Wasseraufwandmenge	200 - 1500 L/ha Wasser (Falscher Mehltau) 500 - 2000 L/ha Wasser (Phytophthora)	
Anzahl der Anwendungen	Max. 2 Anwendungen im Abstand von 7 Tagen	
Gebindegrößen	1 L Flasche (12 x 1 L) 5 L Kanister (4 x 5 L)	

PRODUKT- UND ZULASSUNGSPROFIL

ORONDIS VIP enthält die Wirkstoffe Metalaxyl-M und Oxathiapiprolin zur Bekämpfung von Falschen Mehltaupilzen. Oxathiapiprolin wird schnell in die Wachschicht aufgenommen, translaminar und akropetal verlagert und schützt so nicht nur die behandelte Zielfläche, sondern auch den Neuzuwachs. Der Wirkungsschwerpunkt liegt in der Hemmung der Sporenkeimung.

Metalaxyl-M dringt schnell über Blätter und Stängel in die grünen Pflanzenteile ein und wird mit dem Saftstrom in der Pflanze verteilt. So werden latente Infektionen von Peronospora-Arten im Stängel abgestoppt und der Zuwachs vor weiteren Infektionen geschützt.

Die schnelle Aufnahme der Wirkstoffe in die Wachsschicht (Oxathiapiprolin) und ins Blattgewebe (Metalaxyl-M) sorgt für eine lange Dauerwirkung und gute Regenfestigkeit, was besonders in Phasen mit starkem Neuzuwachs besonders wichtig ist.

EINSATZZEITPUNKT

Aufgrund der unübertroffenen Wirkung in Phasen starken Zuwachs wird ein protektiver Einsatz von ORONDIS VIP in den Hauptwachstumsphasen der Kulturen empfohlen. ORONDIS VIP sollte aus Gründen des Resistenzschutzes nur vorbeugend eingesetzt werden. Wir empfehlen zwischen zwei Applikationen mit ORONDIS VIP ein Fungizid aus einer anderen Wirkstoffgruppe anzuwenden.

VERTRÄGLICHKEIT

ORONDIS VIP ist mit vielen gängigen Pflanzenschutzmitteln mischbar, in vielen Kulturen verträglich und hinterlässt keine Spritzflecken.

Syngenta Agro GmbH
Lindleystraße 8 D · 60314 Frankfurt am Main
www.syngenta.de

BeratungsCenter 0800/32 40 275 (gebührenfrei)

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung. Diese Informationen ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung. Bindend ist der Text an der deutschen Syngenta Verkaufsware. Diese Informationen gelten nur für das Vertriebsgebiet Deutschland. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand November 2026

® = Eingetragene Marke einer Gesellschaft der Syngenta Gruppe Syngenta Agro GmbH

syngenta

Orondis® Vip