


Ertrag und Qualität

QUENCH ist die langjährig bewährte Sommerbraugerste mit überragender Ertragsstabilität. Die sehr gute Strohstabilität und sichere Qualität zeichnen die Sorte aus, die international bei Mälzern und Brauern anerkannt ist.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Spitzenerträge seit mehreren Jahren
- Gutes Proteinniveau für sichere Qualität
- Ausgezeichnete Stroeigenschaften
- International akzeptierte Qualität

QUENCH – 3-jährig führend im Kornertrag




Quelle: LSV Sommergerste Niedersachsen 2014 bis 2016; orthogonal geprüfte Sorten, () = Anzahl Standorte

SORTENPROFIL


Ertrag




Wachstum




Neigung zu



Anfälligkeit für



Qualität



Quelle: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2020

Anbautelegramm Quench

Sommerbraugerste

Anbaueignung

Für alle Braugerstenstandorte

Saatzeitfenster

Saatgutmenge für optimale Bedingungen, Zu- bzw. Abschläge für extreme Trockenstandorte, frühe und späte Höhenlagen berücksichtigen.

| | | |
|----------|---|--|
| Saatzeit | Ab Ende Februar bis Mitte April, ortsüblich | |
|----------|---|--|

| | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|
| Saatstärke (kf. Kö/m ²) | früh/günstig | spät/ungünstig |
|-------------------------------------|--------------|----------------|

| | | |
|--|---------|---------|
| | 240-290 | 290-340 |
|--|---------|---------|

Düngung

Bei Braugerste sollten nur Mineraldünger eingesetzt werden. Zu- oder Abschläge sind je nach standort- und schlagspezifischen Bedingungen vorzunehmen. Die Düngepraxis kann je nach Standortbedingungen modifiziert werden:

| | |
|-------------|----------------|
| Zur Aussaat | 70-110 kg N/ha |
|-------------|----------------|

Auf Standorten mit mäßiger N-Nachlieferung oder niedrigen N_{min}-Gehalten kann die N-Düngung entsprechend erhöht werden.

Wachstumsregler

Bei höherer Stickstoffdüngung sollte eine moderate Wachstumsreglermaßnahme durchgeführt werden zur Absicherung der Standfestigkeit.

| | |
|------------------------|-----------------|
| Tendenz zu ortsüblich: | gering – mittel |
|------------------------|-----------------|

Pflanzenschutz

Geringe bis mittlere Pflanzenschutzintensität. Behandlungsschwerpunkt sollte auf Zwergrost liegen. Pflanzenschutzmaßnahmen sind gezielt nach Krankheitsdruck und Pflanzenschutz-Warndienst durchzuführen.

Für regionale Pflanzenschutzempfehlungen speziell für Ihr Anbaugebiet wenden Sie sich bitte an das Beratungszentrum: 0800-32 40 275 (gebührenfrei).



Quench

syngenta®