

Pflanzenschutz in zweijährigen Zierpflanzen-Kulturen

Aktuelles Zierpflanzen

30.09.2016



Jetzt Blattflecken bei Primeln und Viola bekämpfen

Blattflecken (*Ramularia*, *Mycocentrospora*) entwickeln sich schnell bei hoher Luftfeuchte und Nässe im Bestand. Sporen werden durch Tropf- und Spritzwasser übertragen, Blätter möglichst trocken halten, Luftfeuchte senken, Ventilatoren einsetzen. Gute Wirkung zeigen [Askon*](#) (1,0 l/ha), [Ortiva*](#) (1,0 l/ha) und [Score*](#) (0,4 l/ha).

Mit Revus* gegen Falschen Mehltau vorbeugen

Falscher Mehltau z.B. an Viola, Myosotis und Ranunkeln hat im geschützten Anbau in den letzten Jahren stark zugenommen. Beim Einsatz von [Fongamil Gold**](#) 0,013% gegen *Pythium* und *Phytophthora* in Jungpflanzen eine Woche nach dem Topfen können **Nebeneffekte gegen Falschen Mehltau** genutzt werden. Nach sechs Wochen, wenn genügend Blattmasse vorhanden ist, [Revus*](#) (0,6 l/ha in 1000 l Wasser/ha) applizieren.

Pflanzen vitalisieren mit Hicure

Alle Kulturen können durch den organischen Stickstoffdünger [Hicure](#), 2,5 l/ha, vitalisiert werden. Hicure besitzt einen sehr hohen Anteil an freien Aminosäuren, die von den Pflanzen direkt genutzt werden können.

*genehmigt nach §18a PflSchG. (alt) bzw. Art. 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009.

**Zulassungsende: Fonganil® Gold 31.12.2015, Aufbrauchfrist: 30.6.2017.

Weitere Informationen finden Sie [hier](#) zum Download.

Tags:

zweijährige Kulturen

Violen

Myosotis

Ranunkeln

Iberis

Falscher Mehltau

Blattflecken

Ramularia

Ascochyta

Revus

Fonganil Gold

Ortiva

Score

Hicure

Produkte:

ASKON

ORTIVA

SCORE

REVUS