

Hyvido Anbautelegramm zur N-Düngung im Frühjahr 2018

Aktuelles Getreide
20.02.2018



Um das Ertragspotenzial von [Hyvido](#) voll auszuschöpfen, muss die Stickstoffdüngung im Frühjahr an den frühen Wachstumsstart der Hybridgerste angepasst werden. In diesem Jahr haben wir es zum Teil mit stark geschwächten oder vernässten Beständen zu tun, andererseits finden sich aber auch weit entwickelte und üppige Gerstenflächen. Daher sollte die Andüngung unbedingt an die Pflanzenentwicklung des einzelnen Standortes angepasst werden. Überwiegend ist zum Einsatz schnell verfügbarer Stickstoffdünger zu raten so bald die Flächen befahrbar sind.

Informieren Sie sich im aktuellen [Hyvido Anbautelegramm](#) über unsere Empfehlungen für einen optimalen Wachstumsstart Ihrer Hybridgerste.

Sehen Sie [hier](#) alle Hyvido Anbautelegramme.

Tags:

Hyvido
Anbautelegramm
N-Düngung
Frühjahr
Stickstoffdüngung
Hybridgerste

[3. Hyvido Anbautelegramm: N-Düngung im Frühjahr](#) 1.28 mb