

Deutschland

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.de>)

[Startseite](#) > AXIAL KOMPLETT

AXIAL KOMPLETT



AXIAL KOMPLETT

Zuletzt aktualisiert:

25.05.2020

Herbizid

Zulassungsnummer:

006845-00

Gebindegröße:

4 x 5 Liter

Bonusland Prämienpunkte: 31



Zusammensetzung:

45 g/l (4,6 Gew.-%)

Pinoxaden

5 g/l (0,5 Gew.-%)

Florasulam

11,25 g/l (1,1 Gew.-%)

Cloquintocet-mexyl

Chemische Familie:

Phenylpyrazoline

Triazolpyrimidine

Chinolin

Wirkmechanismus:

HRAC-Gruppe: A (Pinoxaden)

B (Florasulam)

Formulierung:

Emulsionskonzentrat

Wirkungsweise:

AXIAL KOMPLETT wirkt systemisch, d. h. die Wirkstoffe werden über die Blätter aufgenommen und in der Pflanze in das Teilungsgewebe von Halm, Blättern und Wurzeln transportiert.

AXIAL KOMPLETT wird gezielt im Nachauflauf Herbst oder Nachauflauf Frühjahr der Getreidekulturen eingesetzt. Die Ungräser und Unkräuter stellen nach der Behandlung das Wachstum ein. AXIAL

KOMPLETT besitzt keine Bodenwirkung. Deshalb ist die Wirkung unabhängig von der Bodenart oder Bodenfeuchte. Die Schadgräser und Unkräuter müssen vollständig aufgelaufen sein und genügend Blattmasse gebildet haben um die Wirkstoffe aufnehmen zu können.

Herbizid zur Bekämpfung von Ungräsern und Unkräutern in verschiedenen Getreidearten im Nachauflauf.

Product CP: Tabs

- [Anwendungsgebiete](#)
- [Anwendungshinweise](#)

Nach Kultur filtern

- Alle - ▼

Anwenden

Sommerweichweizen, Sommergerste, Sommerhartweizen

Gemeiner Windhalm, Flug-Hafer, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter

Aufwandmenge	Einsatzzeitpunkt (BBCH)	Max. Anzahl an Anwendungen	Wartezeit	Kommentar
1,0 l/ha. Nach dem Auflaufen, Frühjahr	Nach dem Auflaufen, Frühjahr	Maximal 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr	Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. Die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F).	Bitte Gebrauchsanleitung des Produktes beachten.

Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale

Acker-Fuchsschwanz, Weidelgras-Arten, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter

Aufwandmenge	Einsatzzeitpunkt (BBCH)	Max. Anzahl an Anwendungen	Wartezeit	Kommentar
1,3 l/ha. Nach dem Auflaufen, Frühjahr	Nach dem Auflaufen, Frühjahr	Maximal 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr	Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. Die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F).	Bitte Gebrauchsanleitung des Produktes beachten.

Gemeiner Windhalm, Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter

Aufwandmenge	Einsatzzeitpunkt (BBCH)	Max. Anzahl an Anwendungen	Wartezeit	Kommentar
1,0 l/ha. Nach dem Auflaufen, Herbst	Nach dem Auflaufen, Herbst	Maximal 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr	Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. Die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F).	Bitte Gebrauchsanleitung des Produktes beachten.

Gemeiner Windhalm, Flug-Hafer, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter

Aufwandmenge	Einsatzzeitpunkt (BBCH)	Max. Anzahl an Anwendungen	Wartezeit	Kommentar
1,0 l/ha. Nach dem Auflaufen, Frühjahr	Nach dem Auflaufen, Frühjahr	Maximal 1 Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr	Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. Die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F).	Bitte Gebrauchsanleitung des Produktes beachten.

Mischbarkeit

AXIAL KOMPLETT ist aufgrund seiner guten Formulierung und seiner hohen Wirkungssicherheit nach bisherigen Ergebnissen mit einer Vielzahl von Produkten physikalisch mischbar, kulturverträglich und wirkungsstark.

Herbizide:

AXIAL KOMPLETT kann zur Bekämpfung von breitblättrigen Unkräutern mit ALLIANCE®, BIATHLON® 4D, GROPPER® SX, LOREDO® oder Wuchsstoffen [bis max. 900 g Wirkstoff pro ha] gemischt werden. Flüssigdünger:

AXIAL KOMPLETT nicht mit schwefelhaltigen Flüssigdüngern mischen.

AXIAL KOMPLETT ist mit AHL (Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, Marke, keine mit Wasser oder Schwefel verschnittene Ware) mischbar. Dennoch wird der Einsatz von AXIAL KOMPLETT in Tankmischung mit reinem AHL nicht empfohlen, da der optimale Zeitpunkt der ersten Stickstoffgabe (vor/zu Vegetationsbeginn) und der optimale Zeitpunkt der Gräserbekämpfung mit dem blattaktiven AXIAL KOMPLETT (2-3 Wochen nach Vegetationsbeginn) nicht übereinstimmen. Zudem kann es durch die Formulierungstechnologie, die eine sehr schnelle Aufnahme in das Blatt gewährleistet, zu einer Verstärkung von AHL-Symptomen wie Blattaufhellungen oder Blattverätzungen kommen. Diese temporären Symptome können bei Anwendungen unter ungünstigen Witterungsbedingungen (Temperaturschwankungen, Nachtfrost), bei hoher Sonneneinstrahlung oder bei Anwendungen in Beständen mit ungenügend ausgebildeter Wachsschicht bzw. in feuchten Beständen auftreten. Ein Einsatz von AHL-Wasser-Gemisch (Verhältnis von 1 Teil AHL zu mindestens 3 Teilen Wasser) in Tankmischung mit AXIAL KOMPLETT ist bis zu einer AHL-Aufwandmenge von 56 l AHL/ha (ca. 20 kg N) in Winterweizen und Wintergerste bis zum Stadium BBCH 29 des Getreides möglich. Es werden keine Tankmischungen mit AHL in Winterroggen, Wintertriticale und Sommergetreide empfohlen.

Die allgemeinen AHL-Einsatzbedingungen sind genau zu beachten.

Wachstumsregler, Fungizide und Insektizide:

AXIAL KOMPLETT kann mit Wachstumsreglern (MODDEVO™, CCC), Fungiziden und Insektiziden (z.B. KARATE® ZEON, EVURE®) gemischt werden.

Mischpartner in fester Form werden als erstes Produkt in den Tank gegeben.

Mischungen umgehend ausbringen. Standzeiten vermeiden. Während der Arbeitspausen Rührwerk laufen lassen.

Gebrauchsanleitungen der Mischpartner sind zu beachten.

Aufgrund eigener Erfahrung sollten Tankmischungen aus AXIAL KOMPLETT und Produkten, die folgende Wirkstoffe enthalten, nicht vorgenommen werden:

Bifenox-haltigen (z.B. FOX®)

Carfentrazon-haltigen (z.B. ARTUS®)

Wuchsstoff-haltigen [über 900 g Wirkstoff pro ha]

Prohexadion-haltigen (MEDAX® TOP + TURBO).

Für eventuelle negative Auswirkungen durch von uns nicht empfohlene Tankmischungen, insbesondere Mehrfachmischungen, haften wir nicht, da nicht alle in Betracht kommenden Mischungen geprüft werden können. Bei weiteren Fragen zur Mischbarkeit rufen Sie bitte das Syngenta BeratungsCenter, Tel.-Nr. 0800-3240275, an.

Ansetzvorgang

Spritzflüssigkeitsreste sind zu vermeiden. Es ist nur so viel Spritzflüssigkeit anzusetzen, wie tatsächlich benötigt wird. Es ist daher sinnvoll, die erforderliche Spritzflüssigkeitsmenge genau zu berechnen. Insbesondere bei größeren Spritzbehältern bietet sich die Verwendung eines Durchflussmengenmessgerätes bei der Tankbefüllung an. Beim Ansetzvorgang muss die Schutzausrüstung gemäß der Kennzeichnungsaufgaben (Hinweise für den Anwenderschutz) oder Anwendungsbestimmungen getragen werden.

1. Tank mit der Hälfte der benötigten Wassermenge füllen.
2. Rührwerk einschalten (Nenndrehzahl).
3. Produkt vor dem Einfüllen kräftig schütteln.
4. Produkt über die Einspülvorrichtung oder direkt in den Tank geben.
5. Entleerte Präparatebehälter sorgfältig ausspülen und Spülwasser der Spritzflüssigkeit begeben.
6. Tank mit Wasser auffüllen.
7. Spritzflüssigkeit sofort nach dem Ansetzen bei laufendem Rührwerk ausbringen.

Spritztechnik

Beim Ausbringen von AXIAL KOMPLETT ist auf eine feintropfige, gleichmäßige Verteilung der Spritzflüssigkeit zu achten. Auf ausreichende und gleichmäßige Benetzung der Ungräser achten.

Wartezeiten

Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. Die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F).

Wasseraufwandmenge

Wasseraufwandmenge: 200-400 l/ha

Nachbau

Nach der vorschriftsmäßigen Anwendung von AXIAL KOMPLETT können im Rahmen der üblichen ackerbaulichen Fruchtfolge alle Kulturen nachgebaut werden.
