

Deutschland

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.de>)

[Startseite](#) > DYNALI

---

## DYNALI



## DYNALI

Zuletzt aktualisiert:

23.08.2022

### Fungizid

**Zulassungsnummer:**

007501-00

**Gebindegröße:**

12 x 1 Liter, 4 x 5 Liter

**Bonusland Prämienpunkte:** 37



**Zusammensetzung:**

60 g/l (5,6 Gew.-%)

Difenoconazol

30 g/l (2,8 Gew.-%)

Cyflufenamid

Chemische Familie:

Triazole

Amidoxime

**Wirkmechanismus:**

FRAC-Gruppe: G1 (Difenoconazol), unbekannt (Cyflufenamid)

**Formulierung:**

Dispergierbares Konzentrat

**Wirkungsweise:**

Difenoconazol wirkt sowohl vorbeugend als auch befallshemmend, so dass eine weitere Ausbreitung der pilzlichen Schaderreger verhindert wird.

Der Wirkstoff Difenoconazol in DYNALI hat systemische Eigenschaften, wird schnell von grünen Pflanzenteilen wie Blättern und Stängeln aufgenommen und anschließend im Pflanzengewebe transportiert. Der Wirkstoff Cyflufenamid aus der Klasse der Phenylacetamide ist hochwirksam gegen Echte Mehltaupilze und wird translaminar im Blattgewebe transportiert. Cyflufenamid komplettiert die Wirkung von Difenoconazol und beugt Resistenzen vor. Ein bereits eingetretener Schaden an der Pflanze kann durch DYNALI nicht mehr behoben werden.

Klare Ansage gegen Mehltau - jetzt auch zum Traubenschluss

## Product CP: Tabs

- [Anwendungsgebiete](#)
- [Anwendungshinweise](#)

Nach Kultur filtern

- Alle - ▼

Anwenden

### Weinrebe (Nutzung als Tafel- und Keltertraube)

#### Echter Mehltau (*Uncinula necator*)

Aufwandmenge	Einsatzzeitpunkt (BBCH)	Max. Anzahl an Anwendungen	Wartezeit	Kommentar
Basisaufwand: 0,2 l/ha in maximal 400 l Wasser/ha. ES 61: 0,4 l/ha in maximal 800 l Wasser/ha. ES 71: 0,6 l/ha in maximal 1200 l Wasser/ha. ES 75: 0,8 l/ha in maximal 1600 l Wasser/ha	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis.	Bitte Gebrauchsanleitung des Produktes beachten.	Weinrebe (Tafel- und Keltertrauben): 21Tage	Spritzen oder sprühen.

#### Roter Brenner (*Pseudopezicula tracheiphila*)

Aufwandmenge	Einsatzzeitpunkt (BBCH)	Max. Anzahl an Anwendungen	Wartezeit	Kommentar
Basisaufwand: 0,2 l/ha in maximal 400 l Wasser/ha. ES 61: 0,4 l/ha in maximal 800 l Wasser/ha	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis.	maximal 1	Weinrebe (Tafel- und Keltertrauben): 21Tage	Spritzen oder sprühen.

#### Schwarzfäule (*Guignardia bidwellii*)

Aufwandmenge	Einsatzzeitpunkt (BBCH)	Max. Anzahl an Anwendungen	Wartezeit	Kommentar
Basisaufwand: 0,2 l/ha in maximal 400 l Wasser/ha. ES 61: 0,4 l/ha in maximal 800 l Wasser/ha. ES 71: 0,6 l/ha in maximal 1200 l Wasser/ha. ES 75: 0,8 l/ha in maximal 1600 l Wasser/ha	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis.	Maximal 1	Weinrebe (Tafel- und Keltertrauben): 21Tage	Spritzen oder sprühen.

## Mischbarkeit

DYNALI ist mit im Weinbau gängigen Fungiziden (z.B. FOLPAN® 80 WDG, SWITCH®, THIOVIT JET® (Netzschwefel), TAEGRO®, TOPAS®), vielen Insektiziden und Blattdüngern (z.B. Lebosol-Magnesium-Plus) mischbar.

Mischpartner in fester Form (z.B. SWITCH, THIOVIT JET) werden als erstes Produkt in den Tank gegeben.

Mischungen umgehend ausbringen. Standzeiten vermeiden. Während der Arbeitspausen Rührwerk laufen lassen.

Gebrauchsanleitungen der Mischpartner sind zu beachten.

Für eventuelle negative Auswirkungen durch von uns nicht empfohlene Tankmischungen, insbesondere Mehrfachmischungen, haften wir nicht, da nicht alle in Betracht kommenden Mischungen geprüft werden können. Bei weiteren Fragen zur Mischbarkeit rufen Sie bitte das Syngenta BeratungsCenter, Tel.-Nr. 0800-3240275, an.

## Ansetzvorgang

Spritzflüssigkeitsreste sind zu vermeiden. Es ist nur so viel Spritzflüssigkeit anzusetzen, wie tatsächlich benötigt wird. Es ist daher sinnvoll, die erforderliche Spritzflüssigkeitsmenge genau zu berechnen. Insbesondere bei größeren Spritzbehältern bietet sich die Verwendung eines Durchflussmengenmessgerätes bei der Tankbefüllung an. Beim Ansetzvorgang muss die Schutzausrüstung gemäß der Kennzeichnungsaufgaben (Hinweise für den Anwenderschutz) oder Anwendungsbestimmungen getragen werden.

1. Tank mit der Hälfte der benötigten Wassermenge füllen.
2. Rührwerk einschalten (Nenndrehzahl).
3. Produkt vor dem Einfüllen kräftig schütteln!
4. Produkt über die Einspülvorrichtung oder direkt in den Tank geben.
5. Entleerte Präparatbehälter sorgfältig ausspülen und Spülwasser der Spritzflüssigkeit begeben.
6. Tank mit Wasser auffüllen.
7. Spritzflüssigkeit sofort nach dem Ansetzen bei laufendem Rührwerk ausbringen.

## Technische Hinweise

In der Spritzfolge gegen Echten Mehltau wird ein Wirkstoffklassenwechsel empfohlen. Dynali kann 2x eingesetzt werden.

## **Spritztechnik**

Beim Ausbringen von DYNALI ist auf eine gute, gleichmäßige Verteilung der Spritzbrühe zu achten. Überdosierung und Abdrift sind zu vermeiden. Werden Sprühgeräte verwendet, so ist die Konzentration entsprechend der eingesparten Wassermenge zu erhöhen.

Weinbau (in Abhängigkeit vom Entwicklungsstadium):

Wasseraufwandmenge: 400 - 800 l/ha

Die Ausbringung mit Recyclinggeräten ist möglich.

## **Wartezeiten**

Weinrebe (Tafel- und Keltertrauben): 21Tage

## **Wasseraufwandmenge**

Weinbau (in Abhängigkeit vom Entwicklungsstadium):

Wasseraufwandmenge: 400 - 800 l/ha

---